

CATÁLOGO DE CULTIVARES



SEMENTES 

**Semeando
Inovação.**

**Colhendo
Sucesso!**

www.t3sementes.com.br



Somos a T3 Sementes, uma empresa orgulhosamente parte do Grupo Teles, um condomínio agrícola comprometido com a excelência na produção de commodities agrícolas. Nossa jornada teve início em 2008, em Caiapônia-GO, com uma modesta área de 898 hectares. Desde então, crescemos e prosperamos, mantendo alicerces sólidos em valores como simplicidade, confiança, alto desempenho e sustentabilidade.

Na T3 Sementes, dedicamo-nos à produção de sementes certificadas, não apenas para nosso próprio plantio, mas também para compartilhar com parceiros comerciais. A qualidade que cultivamos é um reflexo do compromisso que temos com a inovação, a confiabilidade e o futuro sustentável da agricultura.





UBS T3 Sementes
Unidade de Jataí - GO

Área de atuação



Encontre um representante
comercial próximo de você!



TSI

VANTAGENS

Nosso TSI garante que **cada semente receba a dose precisa de proteção**, blindando o seu potencial genético para uma lavoura de alta performance e com máxima segurança.

- ✓ **Blindagem completa:** Recobrimento totalmente homogêneo.
- ✓ **Aderência máxima** dos ativos à semente.
- ✓ **Redução drástica** de perdas e falhas no estande.
- ✓ **Eficiência superior** no controle de pragas e doenças.



SOY COMBATEIPRO

GNS 7400 IPRO



PONTOS FORTES

- Abertura de plantio;
- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade produtiva;
- Resistência a nematóides

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Porte médio de planta 85 cm
- Grupo de maturação 7.4
- PMG médio 170 g
- Ciclo 100 – 118 dias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Nematóide de Cisto 1, 3, 14				
Nematóide de Cisto 5, 9, 10				
Nematoide de Galha Meloidogyne javanica				
Acamamento				

S. SUSCETÍVEL - MS. MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR. MERAMENTE RESISTENTE - R. RESISTENTE

INDICAÇÃO DE SEMEADURA													POPULAÇÃO (mtl/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
NORTE MS / SUDOESTE GO													220 - 300	113
SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP													220 - 300	110
SUDESTE GO / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAÍBA													220 - 300	115
LESTE GO / DF / NOROESTE MG													220 - 300	117
SUL MT / SUDOESTE MT													260 - 300	108
BR 163 / PARECIS / SUL DE RO													280 - 340	105
VALE DO ARAGUAIA / XINGU													320 - 380	103
SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													260 - 340	103
ESTE BAHIA													280 - 360	105
SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													340 - 360	100



SOY SOBERANA

GNS 7902 i2x



PONTOS FORTES

- Porte controlado;
- Alto potencial produtivo;
- Resistência a nematoide de cisto;
- Perfil de planta similar à concorrência.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Porte médio de planta 90 cm
- Grupo de maturação 7.9
- PMG médio 195 g
- Ciclo 108 – 118 dias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Nematoide de cisto 1,3 e 10				
Nematoide de Cisto 4,5,6,9 e 14				
Acamamento				

S. SUSCETÍVEL - MS. MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR. MERAMENTE RESISTENTE - R. RESISTENTE

INDICAÇÃO DE SEMEADURA													POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
BA - OESTE													200 – 240	114
GO - GOIÁS													180 – 240	118
MT - MATO GROSSO													200 – 260	108
TOCANTINS													260 – 300	108



SOY COMPLETAIPRO

GNS 7901 PRO



PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade produtiva;
- Ampla região de adaptação;
- Resistência a nematoides;
- Sanidade radicular;
- Tolerancia a macrophomina.

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Nematoide de cisto 3 e 14+				
Nematoide de cisto 1, 5, 6, 9 e 14				
Nematoide de Galha M. Incógnita				
Acamamento				

S. SUSCETÍVEL - MS. MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR. MERAMENTE RESISTENTE - R. RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Porte médio de planta 90 cm
- Grupo de maturação 7.9
- PMG médio 180 g
- Ciclo 108 – 127 dias

INDICAÇÃO DE SEMEADURA													POPULAÇÃO (mt/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
NORTE MS / SUDOESTE GO													180 - 220	120
SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP													180 - 220	127
SUDESTE GO / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAÍBA													180 - 220	120
LESTE GO / DF / NOROESTE MG													180 - 220	125
SUL MT / SUDESTE MT													240 - 300	118
BR 163 / PARECIS / SUL DE RO													240 - 300	112
VALE DO ARAGUAIA / XINGU													240 - 300	110
SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													240 - 300	108
OESTE BAHIA													200 - 240	116
SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													240 - 300	108



SOY MURALHAIPRO

GNS 8200 IPRO



PONTOS FORTES

- Resistente à acamamento;
- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade produtiva;
- Excelente pegamento de vagens.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Porte médio de planta 90 cm
- Grupo de maturação 8.2
- PMG médio 185 g
- Ciclo 112 – 126 dias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
	☐	☐	☐	☒
Mancha olho de rã	☐	☐	☒	☐
Pústula bacteriana	☐	☐	☒	☐
Mancha Alvo	☐	☐	☒	☐
Oídio	☐	☐	☐	☒
Meloidogyne javanica	☐	☐	☒	☐

S. SUSCETÍVEL - MS. MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR. MERAMENTE RESISTENTE - R. RESISTENTE

INDICAÇÃO DE SEMEADURA													POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
LESTE GO / DF / NOROESTE MG													180 - 220	126
SUL MT / SUDOESTE MT													200-280	120
BR 163 / PARECIS / SUL DE RO													200-280	118
VALE DO ARAGUAIA / XINGU													200-280	115
SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													180 - 260	120
OESTE BAHIA													180 - 240	125
SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													200-280	114
LESTE MA / NORTE PA / BAIXO AMAZONAS													200-280	112



PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Precocidade
- Resistência ao nematoide de cisto
- Não apresenta tecnologia STS
- Excelente arquitetura de planta

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 6.9
- PMG médio 175 g
- Ciclo 90 – 113 dias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha Olho-de-Rã				
Pústula bacteriana				
Podridão radicular de fitóftora				
Nematoide de cisto 3, 6 e 9				
Nematoide de cisto 10				

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE

INDICAÇÃO DE SEMEADURA													POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
MT - Médio Norte													355 - 422	93-98
MT/RO - Parecis													355 - 400	95-100
MT - Vale do Araguaia													355 - 422	93-98
MT - Sul													311 - 355	103-108
MS - Norte													244 - 311	103-108
GO - Sudoeste													244 - 311	103-108
GO - Norte													244 - 289	103-108
MG - Triângulo													222 - 289	108-113
SP - Norte													244 - 311	108-113
BA - Irrigado													355 - 422	90-95

TMG PAINEIRA i2X

23.308 i2X



PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo
- Resistência ao nematoide de cisto
- Excelente porte de arquitetura de planta
- Intacta2Xtend
- Ampla região de adaptação

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Pústula bacteriana (X. axonopodis)				
Nematoide de cisto 6				
Nematoide de cisto 3 e 9				

*O PMG poderá variar dependendo do ambiente onde a cultivar for explorada. Aguardando dados safra 23/24.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 7.3
- PMG médio 177 g
- Ciclo 110 - 135 dias

INDICAÇÃO DE SEMEADURA																	POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO					
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
MT - Médio Norte																	310 - 378	98-103
MT - Oeste Parecis																	333 - 400	98-103
MT - Vale do Araguaia																	311 - 378	98-103
MT - Sul																	311- 356	105 - 110
MS - Norte																	244 - 311	114- 119
GO - Norte																	245 - 320	95-100
GO - Sudoeste / MS Chapadões																	244 - 311	114-119
GO - Sul e Sudeste																	267 - 311	115-120
RO - Alto																	333 - 400	98-103
MG - Triângulo (Baixo)																	200 - 289	115-120
MG - Triângulo e Alto Parnaíba																	200 - 289	116- 121
MG - GO I PADF																	267 - 311	115-120
MG - Sul																	200 - 289	116-121
BA - Oeste																	350 - 415	95- 100
SP - Norte																	222 - 289	116-121

TMG MURICI i2X

22.210 I2X



PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo
- Resistência ao nematoide de cisto
- Excelente porte e arquitetura de planta
- Ampla região de adaptação
- Tecnologia Intacta2Xtend

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Pústula bacteriana				
Nematoide de cisto 3, 6 e 9				
Nematoide de cisto 10				

S. SUSCETÍVEL - MS. MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR. MERAMENTE RESISTENTE - R. RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 7.6
- PMG médio 177 g
- Ciclo 103 - 128 dias

INDICAÇÃO DE SEMEADURA													POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
MT - Médio Norte													311 - 378	102-109
MT/RO - Parecis													311 - 378	107-115
MT - Vale do Araguaia													333 - 378	103-113
MT - Sul													311 - 355	110-117
MS - Norte													244 - 311	118-128
GO - Sudoeste													244 - 311	117-127
GO - Norte													244 - 311	111-119
MG - Triângulo													222 - 289	120-130
SP - Norte													222 - 289	120-130
BA - Oeste													333 - 378	110-116
MA													333 - 378	90-98
TO													333 - 378	104-113

PONTOS FORTES

- Altíssimo potencial produtivo
- Resistência ao namatoide de cisto
- Excelente amplitude de adaptação
- Intacta2Xtend

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Pústula bacteriana (X. axonopodis)				
Nematoide de cisto 6				
Nematoide de cisto 3 e 9				

*O PMG poderá variar dependendo do ambiente onde a cultivar for explorada. Aguardando dados safra 23/24.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 7.9
- PMG médio 185 g
- Ciclo 110 - 125 dias

INDICAÇÃO DE SEMEADURA																POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
MT/GO - PADF																200 – 300	120-125
MT - Sul																240 – 340	112-117
MT - Médio Norte																260 – 360	110-115
MT - Oeste (Parecis)																260 – 360	110-115
RO - Alto																260 – 360	110-115
RO - Baixo																240 – 340	110-115
MT - Vale do Araguaia																260 – 360	110-115
GO - Norte																200 – 300	120-125
TO - Sul																200 – 300	105-110
BA - Oeste (Sequeiro ou Irrigado)																220 – 320	115-120

PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo
- Resistência ao nematoíde de cisto
- Ampla região de adaptação
- Boa arquitetura de planta
- Boa tolerância a chuva na colheita

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 8.1
- PMG médio 175 g
- Ciclo 102 - 135 dias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Nematoíde de cisto 3, e 9				
Nematoíde de cisto 6				

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE

INDICAÇÃO DE SEMEADURA																	POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO					
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
MT - Médio Norte																	244 - 333	110-119
MT/RO - Parecis																	244 - 355	112-122
MT - Vale do Araguaia																	222 - 333	107-116
MT - Sul																	222 - 311	115-123
MS - Norte																	200 - 266	120-130
GO - Sudoeste																	200 - 266	118-128
GO - Norte																	200 - 289	123-132
MG - Triângulo																	178 - 266	125-135
MA																	266 - 378	102-111
TO																	266 - 378	107-115
PI																	266 - 378	102-111
BA - Oeste																	244 - 333	123-132
PA - Sul																	266 - 378	
PA - Nordeste																	311 - 378	

TMG 22X83 i2X

22.082 i2X



PONTOS FORTES

- Ótima arquitetura de planta
- Boa plasticidade populacional
- Alto teto produtivo
- Ampla adaptação regional
- Tecnologia Intacta2 Xtend

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Semideterminado
- Grupo de maturação 8.3
- PMG médio 175 g
- Ciclo 110 - 135 dias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho-de-rã				
Podridão radicular de fitófтора				

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE

INDICAÇÃO DE SEMEADURA																	POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO					
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
MT - Médio Norte																	222 - 311	102-109
MT/RO - Parecis																	222 - 311	107-115
MT - Vale do Araguaia																	244 - 311	103-113
MT - Sul																	266 - 289	110-117
MS - Norte																	222 - 266	118-128
GO																	222 - 289	117-127
MA																	244 - 333	111-119
TO																	244 - 333	120-130
PI																	244 - 355	120-130
BA - Oeste																	222 - 311	110-116
PA - Sul																	266 - 311	90- 98
PA - Nordeste																	266 - 289	104-113



CORDIUS C2810CE



PONTOS FORTES

- Tecnologia Conkesta Enlist
- Alto rendimento
- Bom potencial de engalhamento

DOENÇAS

	S	MS	MT	T
Mancha-alvo				
Nematoide de cisto raça 3				

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE TOLERANTE - T: TOLERANTE

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 8.1
- PMG médio 185 g
- Ciclo 112 - 120 dias

INDICAÇÃO DE SEMEADURA																POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
MT - Sudeste / GO - Oeste																250 - 300	115-120
MT - Norte																270 - 310	115-120
MT - Nodeste																270 - 310	115-120
BA - Oeste																290 - 330	112-118
MATOPIBA / PA - Sudeste																290 - 330	112-118



CORDIUS C2790CE



PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Alto PMG
- Tolerância a Nematóide de cisto

DOENÇAS

	S	MS	MT	T
Cancro da Haste	☐	☐	☐	☒
Nematóide de cisto raça 3	☐	☐	☐	☒

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE TOLERANTE - T: TOLERANTE

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 7.9
- PMG médio 200 g
- Ciclo 105-115 dias

INDICAÇÃO DE SEMEADURA																POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DAS)
REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO				
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
MT - Sudeste / GO - Oeste																280 - 330	110-115
MT - Norte																280 - 330	105-110
MT - Nodeste																280 - 330	105-110





 t3.sementes

www.t3sementes.com.br

comercial@t3sementes.com.br